


واکسیناسیون ضد HPV یا پاپیلوما و ویروس انسانی




این واکسین برای
محافظت از طفلم
در برابر HPV
بسیار مهم
است.

برای پسران و دختران ۱۱ ساله و بالاتر
این واکسین اجباری نیست
ولی به طور جدی توصیه می‌شود.




HPV چیست؟

HPV ویروس‌های انسانی اند که به نام پاپیلوماویروس یاد می‌شوند.
HPV بسیار زیاد هستند.
حدود ۲۰۰ نوع مختلف پاپیلوماویروس‌ها وجود دارند.



HPVها بسیار ساری هستند:

به این معنی که بسیار ساده از یک شخص به شخص دیگر سرایت می‌کنند.
اکثریت مردم این ویروس‌ها را در وجود خود می‌داشته باشند.



ویروس‌های HPV اکثراً در اولین ارتباط جنسی منتقل می‌شوند.

کاندوم به طور کامل در برابر HPV محافظت کرده نمی‌تواند.

وجود ما اکثریت اوقات این ویروس‌ها را از بین می‌برد.


زمانی که توسط وجود ما از بین برده نشوند، می‌توانند باعث به وجود آمدن موارد زیر شوند:

- ضایعات پیش‌سرطانی،
به این معنی که زمانی که هنوز سرطان وجود نمی‌داشته باشد،
- سرطان‌ها،



- زگیل‌ها یا دانه‌های آنوژنیال.
این زگیل‌ها در سطح مقعد و آلت تناسلی ظاهر می‌شوند.
زگیل‌ها جدی نیستند ولی درد آورد می‌باشند.


هر کس، چه مرد باشد چه زن، می‌تواند مصاب به ضایعات پیش‌سرطانی، سرطان و زگیل شود.



همه‌ساله در فرانسه HPVها باعث می‌شوند:


- ۱۰۰ هزار زگیل‌ها
- ۶۴۰۰ واقعات جدید سرطان

واکسین HPV یک
داروی محافظتی است.
این مصئون است.



واکسین HPV در برابر موارد زیر از طفل شما محافظت می‌کند:


- ضایعات پیش‌سرطانی و/یا سرطان‌ها:
- دهانه رحم،
- فرج،
- واژن،
- مقعد،
- زگیل‌های آنوژنی‌تال



واکسین HPV مؤثر و مصئون است.

بیش از ۱۰۰ میلیون طفل پیش از پیش در سطح جهان
واکسین شده‌اند.

در کدام سن باید طفلم واکسین شود؟





واکسیناسیون برای پسران و دختران از ۱۱ سال الی ۱۴ سال توصیه می‌شود.

هرچه زودتر طفل خود را واکسین کنید، واکسین به همان اندازه بیشتر در مقابل بیماری‌ها از او محافظت می‌کند.

به ۲ دوز واکسین نیاز دارید تا محافظت شوید.


پیچکاری یا دوز دوم را ۵ تا ۱۳ ماه بعد فراموش نکنید.

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| ۱ ماه  | ۲ ماه | ۳ ماه | ۴ ماه |
| ۵ ماه | ۶ ماه  | ۷ ماه | ۸ ماه |
| ۹ ماه | ۱۰ ماه | ۱۱ ماه | ۱۲ ماه |

طفل شما همزمان می‌تواند دریافت کند:

- یک دوز واکسین HPV،
 - واکسین دیگر، مثلاً واکسین تقویت‌کننده یا بوستر آن.
- تقویت‌کننده یا بوستر واکسین dTcaP باید بین سنین ۱۱ الی ۱۳ اجرا شود. dTcaP واکسین ضد دیفتی، تیتانوس، سیاه‌سرفه و فلج اطفال است.




اگر واکسین کردن طفلم را فراموش کنم؟



واکسیناسیون هنوز هم ممکن است
بین سنین ۱۵ الی ۱۹ سال.

در آن زمان باید ۳ دوز واکسین گرفت تا محافظت شود.

فراموش نکنید که دوزهای دوم و سوم را،
۲ و ۶ ماه پس از دوز اول تطبیق نمایید.

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| ۱ ماه  | ۲ ماه | ۳ ماه  | ۴ ماه |
| ۵ ماه | ۶ ماه | ۷ ماه  | ۸ ماه |
| ۹ ماه | ۱۰ ماه | ۱۱ ماه | ۱۲ ماه |

که می‌تواند طفلم را واکسین نماید؟



یک داکتر



یک فارمسیست



یک قابله



یک نرس



همچنین می‌توانید به یک مرکز واکسیناسیون مراجعه نمایید.

چقدر هزینه دارد؟

صندوق بیمه صحتی شما ۶۵٪ از قیمت هر دوز واکسین را تادیه می‌کند.

به طور مثال، بیمه صحتی شما از ۱۰۰ یورو ۶۵ یورو را به شما دوباره پرداخت می‌کند.

باقی‌مانده توسط شرکت بیمه متقابل شما پرداخت خواهد شد.




| BENEFICIAIRE - NOM - PRENOM | | PHAR. CENT. ALUM. LARA. ESTE. COBL. TRAN. HOCF. HOSD. CHAM. DESQ. | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DATE DE MARIAGE - N° SECURITE SOCIALE | | PHAR. TRIPHA. | CENT. TRIPHA. | ALUM. TRIPHA. | LARA. TRIPHA. | ESTE. TRIPHA. | COBL. TRIPHA. | TRAN. TRIPHA. | HOCF. TRIPHA. | HOSD. TRIPHA. | CHAM. TRIPHA. | DESQ. TRIPHA. |
| XXXXXX XXXX | 123456789 12 P22017 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| XXXXXX XXXX | 123456789 12 P22017 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| XXXXXX XXXX | 123456789 12 P22017 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |

واکسیناسیون رایگان است:

- در کالج برای متعلمین صنف پنجم،
- در مراکز خاص واکسیناسیون در شهر یا منطقه شما،
- اگر دارای خدمات صحتی تکمیلی همبستگی یا حمایت صحتی دولتی هستید.

طفل شما در كالج، در صنف پنجم،



با اجازه شما،
طفل شما در كالج واکسين شده می تواند:

- توسط یک داکتر،
- توسط یک فارمسیست،
- توسط یک قابله،
- توسط یک نرس.



طفل شما ۲ بار واکسين خواهد شد.
او باید کتابچه صحت خود را داشته باشد.
واکسيناسيون رایگان خواهد بود.

اگر طفل شما اولین دوز واکسين را از قبل دریافت کرده باشد،
او می تواند دوز دوم را در كالج دریافت کند.

۴۰۰ هزار کودک ۱۲ ساله در سال ۲۰۲۳ واکسين شده اند.

برای معلومات بیشتر





با داکتر خود صحبت نمایید یا به این
صفحه بروید e-cancer.fr

برای صحبت در مورد آن با طفل خود



صفحه اختصاصی ما را ببینید
preventionenfant.e-cancer.fr

برای دانستی‌های بیشتر در مورد واکسیناسیون



با SantéBD اختصاصی مشوره
نمایید که رایگان قابل دسترس است
www.santebd.org

تصاویر: ©SantéBD

بروشور FALC
آسان برای خواندن و فهمیدن
تصحیح شده برای مردم
با ناتوانی ذهنی
ESAT l'Envol (Unapei 34)



©لوگوی اروپایی، آسان برای خواندن: شمولیت اروپا. معلومات بیشتر را در سایت دریافت کنید. www.easy-to-read.eu