

CANCERS LIÉS AUX PAPILLOMAVIRUS

VACCINATION
+
DÉPISTAGE
=

Fin des cancers !



QUI ?

QUOI ?

COMMENT ?

LE SAVIEZ-
VOUS ?



**l'Assurance
Maladie**
Agir ensemble, protéger chacun

Bretagne

**DÉPISTAGE
DESCANCERS**
Centre de coordination
Bretagne

ars
Agence Régionale de Santé
Bretagne

LE VIRUS


QUI ?



Les Papillomavirus sont véhiculés par les hommes et les femmes.

QUOI ?

Les Papillomavirus



Il existe de nombreux virus dans la famille des papillomavirus humains (HPV) qui peuvent nous infecter tous, le plus souvent sans signe d'infection (sans symptôme).

COMMENT ?

Ces virus se transmettent par voie sexuelle, par contact direct des muqueuses ou de la peau.

En général, le corps parvient à les éliminer mais, dans certains cas, ces infections persistent et provoquent des lésions pré-cancéreuses qui évoluent parfois en cancer, dont le plus fréquent est le cancer du col de l'utérus. Mais elles provoquent aussi des cancers de l'anus, du vagin, de la vulve ou de la gorge.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Chacun, chacune peut être exposé(e) quelle que soit sa sexualité

Les papillomavirus humains se transmettent par simple contact lors de rapports oraux, par pénétration vaginale, digitale, etc.

LE CANCER DU COL DE L'UTERUS

Le cancer du col de l'utérus est le plus fréquent des cancers dus aux papillomavirus.



3 000 nouveaux cas par an.

1 100 décès de femmes par an, des suites d'un cancer du col de l'utérus.

80%

des femmes sont infectées par les HPV au cours de leur vie.

PRÉVENTION : 2 MOYENS COMPLÉMENTAIRES

> LA VACCINATION HPV



pour protéger contre une grande partie des virus

> LES FROTTIS DE DÉPISTAGE



pour détecter les lésions pré-cancéreuses

LA VACCINATION

QUI ?



Les jeunes **FILLES ET GARÇONS**
dès **11 ANS** et jusque **14 ANS**

QUOI ?

2 injections sont nécessaires.



espacées de
6 à 13 mois



Profitez du rappel vaccinal DTCP (Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Poliomyélite) pour faire la première injection HPV

COMMENT ?



Qui réalise la vaccination ?

- > un médecin / gynécologue / pédiatre
- > une sage-femme
- > un(e) infirmier(-ière) sur prescription médicale

LE SAVIEZ
-VOUS ?



Le vaccin est d'autant plus efficace que les jeunes filles et les jeunes garçons n'ont pas encore été exposés au risque d'infection par le HPV.

CONTRE LES HPV



Les jeunes **FILLES ET GARÇONS**

de **15 ANS** à **19 ANS** non vaccinés

et jusqu'à **26 ANS** révolus pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

3 injections sont nécessaires (une dose de +)
si cette vaccination HPV n'est pas débutée avant l'âge de 15 ans.



Où réaliser la vaccination ?

- > dans un cabinet médical
- > dans un centre public de vaccination / hôpital
- > dans un centre mutualiste / de planification, etc.

Les hommes concernés aussi

25%

des cancers liés aux infections aux HPV surviennent chez les hommes (cancer de l'anus, de la gorge, etc.)
La vaccination protège les hommes et les femmes des cancers dus aux papillomavirus.

LE FROTTIS


QUI ?



TOUTES LES FEMMES DE **25 à 29 ANS**

- ✓ même vaccinées
- ✓ même si vous n'avez pas eu de rapports sexuels depuis longtemps

QUOI ?



COMMENT ?

LE FROTTIS DE DEPISTAGE, C'EST QUOI ?

Un prélèvement sur le col de l'utérus suivi d'une analyse des cellules



Où réaliser le frottis ?

- > dans un cabinet médical de ville
- > dans un centre de santé / mutualiste / de planification
- > dans un hôpital
- > dans certains laboratoires de biologie médicale (sur prescription)

Vaccins + frottis = 2 actes complémentaires

- ✓ La vaccination ne protège pas contre tous les HPV.
- ✓ Le dépistage par frottis doit donc être réalisé en complément.
- ✓ Le frottis permet de repérer des cellules anormales au niveau du col de l'utérus afin de les traiter avant qu'elles ne se transforment en cancer.


LE SAVIEZ-VOUS ?

DE DÉPISTAGE

TOUTES LES FEMMES DE **30** à **65 ANS**



- ✓ même vaccinées
- ✓ même enceintes
- ✓ même ménopausées
- ✓ même si vous n'avez pas eu de rapports sexuels depuis longtemps



UN TEST HPV, C'EST QUOI ?

C'est la recherche de présence ou non de papillomavirus grâce à un prélèvement sur le col de l'utérus (=frottis)



- Le frottis est réalisé par :
- > un médecin généraliste ou
 - > une sage-femme ou
 - > un gynécologue

Les personnes non strictement hétérosexuelles concernées aussi

Si vous avez déjà eu un contact cutané au niveau de la région génitale avec un partenaire, quel que soit son genre, il est essentiel de réaliser un test de dépistage aux intervalles recommandés, sauf en cas d'hymen intact.



Hommes ou femmes, parents, adolescents...
la prévention des cancers liés aux papillomavirus vous concerne.

Parlez-en à votre médecin ou sage-femme !

Un contact pour répondre à vos questions :

contact_col_uterus@depistage-cancer.bzh

Des sites pour aller plus loin

> Sur les dépistages :
www.e-cancer.fr

> Sur la vaccination :
www.vaccination-info-service.fr

> Sur la prévention et la prise en charge :
www.ameli.fr

Cpam 35 - PAO 1201 - Janvier 2022